


collost

Рекомендации по применению  
препаратов COLLOST®  
с аппаратными методиками  
в косметологии




# Применение COLLOST® до и после лазеров



аппаратная косметология	инъекции COLLOST® до процедуры	инъекции COLLOST® после процедуры	одномоментное применение
Неабляционный лазер Эрбий (слабо, среднеинтенсивные параметры)	<p>за 3 недели – COLLOST® micro 3–5%, COLLOST® 7%</p> <p>за 4 недели – COLLOST® micro 6–15%, COLLOST® 15%</p>	после 2 недели	после лазера
Неабляционный лазер Эрбий (высокоинтенсивные параметры) Неодим	за 6 недель	после 2 недель	после лазера
Абляционный лазер:	за 6 недель	после 2–4 недели (после разрешения посттравматической эритемы)	после лазера


# Применение COLLOST® до и после RF



аппаратная косметология	инъекции COLLOST® до процедуры	инъекции COLLOST® после процедуры	одномоментное применение
Игольчатый RF	<p>за 3 недели – COLLOST® micro 3–5%, COLLOST® 7%</p> <p>за 4 недели – COLLOST® micro 6–15%, COLLOST® 15%</p>	<p>после 1–3 недели в зависимости от интенсивности примененных параметров, чувствительности кожи при применении аппликационной анестезии</p>	после RF
Монополярный RF	<p>за 3 недели – COLLOST® micro 3–5%, COLLOST® 7%</p> <p>за 4 недели – COLLOST® micro 6–15%, COLLOST® 15%</p>	после 2–3 недели	после RF*

\* Решение о целесообразности нанесения топических анестетиков принимает врач исходя из клинической картины

# Применение COLLOST® с лазерами, RF



При умеренных  
изменениях

COLLOST® micro  
3–5%

COLLOST®  
7%

При выраженных  
изменениях

COLLOST® micro  
6–15%


COLLOST®  
15%

При атрофических  
рубцах

COLLOST® micro  
6–15%

COLLOST®  
15%


# Применение COLLOST® до и после IPL и HiFu



аппаратная косметология	инъекции COLLOST® до процедуры	инъекции COLLOST® после процедуры	одномоментное применение
IPL/BBL	<p>за 3 недели – COLLOST® micro 3–5%, COLLOST® 7%</p> <p>за 4 недели – COLLOST® micro 6–15%, COLLOST® 15%</p>	<p>после 1–3 недели в зависимости от интенсивности примененных параметров, чувствительности кожи при применении аппликационной анестезии</p>	Нет
Ультразвуковой термолифтинг (HiFu/MFU)	<p>за 3 недели – COLLOST® micro 3–5%, COLLOST® 7%</p> <p>за 4 недели – COLLOST® micro 6–15%, COLLOST® 15%</p>	после 2 недели	После HiFu*

\* Решение о целесообразности нанесения топических анестетиков принимает врач исходя из клинической картины

# Применение COLLOST® с IPL и HiFu



При умеренных  
изменениях

COLLOST® micro  
3–5%

COLLOST®  
7%

При выраженных  
изменениях

COLLOST® micro  
6–15%

COLLOST®  
15%