

Омоложение кожи шеи

Методика коллагенотерапии препаратами линейки Collost с целью уплотнения кожи области шеи и уменьшения глубины морщин.



Анастасия Ромашкина

К. м. н.,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, трихолог,
физиотерапевт, Москва

[romashkinaas](https://www.instagram.com/romashkinaas)



Дополнительное видео

Введение

Состояние кожи шеи часто выдаёт возраст. Развитие признаков старения данной области определяется рядом факторов:

1. Кожа шеи очень тонкая, количество сальных желёз меньше, чем в области лица.
2. В коже шеи содержится меньшее количество меланоцитов, что обуславливает плохую защиту от ультрафиолетового облучения.
3. Области шеи часто уделяется меньше внимания: реже проводятся косметологические процедуры и наносятся средства для домашнего ухода.
4. Область сопряжена с ежедневными повторяющимися нагрузками: поворотами и наклонами шеи, жеванием и так далее. Это обуславливает быстрое появление горизонтальных статических морщин.


Основные запросы, с которыми обращаются пациенты для коррекции данной зоны, — уплотнение кожи и уменьшение глубины морщин. Удовлетворение запроса невозможно без коррекции изменений в соединительнотканых структурах кожи.

Материалы и методы

Препараты коллагена Collost позволяют создать коллагеновый запас в дерме. Препарат Collost Micro содержит 150 мг коллагена и благодаря запатентованной технологии MicronONIC активирует неоколлагенез, а за счёт технологии PoliONICol — гидратацию тканей — это начальный этап работы с кожей шеи. На заключительном этапе препарат Collost 15% гель позволяет уменьшить глубину морщин.



1



2



3

Протокол процедуры

С целью коррекции области шеи применяется препарат Collost Micro, гидратированный 0,9% раствором натрия хлорида и препарат Collost 15% гель. В зависимости от объёма используемого натрия хлорида процент коллагена, получаемый при гидратации препарата Collost Micro может варьировать от 3% (разведение 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида) до 10% (разведение 1,5 мл 0,9% раствора натрия хлорида).

Курс состоит из трёх процедур, проводимых с интервалом в две недели.

Первая процедура — Collost Micro, один флакон, разведение в 2,5 мл 0,9% натрия хлорида.

Вторая процедура — Collost Micro, один флакон, разведение в 1,5 мл 0,9% натрия хлорида.

Третья процедура — Collost 15% гель, один шприц, 1 мл.

1. Демакияж, очищение кожи мягкими средствами без кислот и отдушек.
2. Обработка лица раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%.
3. Аппликационная анестезия препаратом «Акриол Про», экспозиция 30 минут.
4. Инъекционирование гидратированных препаратов в технике папульных интрадермальных инъекций, игла 32G — для препаратов Collost Micro (первая и вторая процедуры) и 30G для препарата Collost 15% гель (третья процедура).

Техника выполнения процедуры ^[Фото 1]:

- Вдоль статических горизонтальных морщин шеи инъекции выполняются в технике микропапульных инъекций, папула за папулой, создавая единую линию, напоминающую ожерелье ^[Фото 3].
 - Между обозначенными линиями инъекции проводятся в технике папульных инъекций плотной укладки: первая процедура — на расстоянии 2 мм друг от друга ^[Фото 5], вторая–третья процедуры — на расстоянии 3–4 мм. Между обозначенными маркером линиями инъекции проводятся в технике микропапульных инъекций на расстоянии 2 мм друг от друга.
5. Обработка лица раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%.
 6. Нанесение противовоспалительного крема («Бепантен», La Roche Posay Cicaplast, «Траймель»).

Разработанный протокол с использованием препаратов Collost Micro и Collost 15 % гель может эффективно использоваться как процедура улучшения качества кожи и омоложения шеи.



Результаты коррекции

Сразу после процедуры отмечается формирование папул, что является нормальной реакцией на введение препаратов коллагена ^[Фото 7]. Благодаря использованию техники микропапульных инъекций сокращается период реабилитации, минимизируется количество постпроцедурных гематом ^[Фото 8]. ●





6a. До



6b



6c



7a. Сразу после



7b



7c



8a. Через 48 дней



8b



8c